

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП - 006803-250271

СОГЛАСОВАНО

ДЕКВАЛИНИЯ ХЛОРИД

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ДЕКВАЛИНИЯ ХЛОРИД

Международное непатентованное или группировочное наименование: деквалиния хлорид

Лекарственная форма: таблетки вагинальные

Состав

1 таблетка содержит:

действующее вещество: деквалиния хлорид – 10 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая тип 101, магния стеарат.

Описание

Двояковыпуклые таблетки овальной формы, без риса, белого или почти белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство

Код АТХ: G01AC05

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат содержит действующее вещество деквалиния хлорид, которое является четвертичным аммониевым соединением с широким спектром антимикробной активности. Деквалиния хлорид активен в отношении большинства грамположительных бактерий *Streptococcus* spp., включая бета-гемолитические стрептококки группы А и В, *Staphylococcus aureus*, *Listeria* spp., анаэробов *Peptostreptococcus* (группы D), грибов рода *Candida* (*Candida tropicalis*, *Candida albicans*, *Candida glabrata*), грамотрицательных бактерий *Gardnerella vaginalis*, *Escherichia coli*, *Serratia* spp., *Klebsiella* spp., *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp. и простейших (*Trichomonas vaginalis*).

Фармакокинетика

При интравагинальном введении крайне незначительное количество деквалиния хлорида всасывается через слизистую оболочку влагалища в системный кровоток, метаболизируется до производного 2,2-дикарбоновой кислоты и выводится в неконъюгированной форме через кишечник.

129358

Показания к применению

- бактериальный вагиноз
- кандидозный вагинит
- трихомонадный вагинит
- санация влагалища перед гинекологическими операциями и родами

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП - 006803-250221
СОГЛАСОВАНО

Противопоказания

Повышенная чувствительность к деквалинию хлориду и другим компонентам препарата.
Язвенные поражения эпителия влагалища и шейки матки.

Противопоказано применение деквалиния хлорида до начала половой жизни.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат разрешен к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Только для интравагинального применения.

Рекомендуемый режим дозирования – 1 вагинальная таблетка в сутки. Вагинальную таблетку вводят глубоко во влагалище вечером перед сном, лежа на спине, слегка согнув ноги.

Курс лечения 6 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Во время менструации лечение следует прекратить и продолжить прежний курс после ее окончания. Необходимо провести полный курс (6 дней) во избежание рецидива.

Побочное действие

Крайне редко могут наблюдаться местные реакции раздражения (эрозии), зуд, жжение или покраснение слизистой оболочки влагалища. Однако эти нежелательные реакции также могут быть связаны с симптомами вагинальной инфекции.

Крайне редко: лихорадка, аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном приеме препарата внутрь возможно усиление побочных эффектов. Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

129358

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Деквалиния хлорид несовместим с мылом и другими анионными поверхностно-активными веществами

Особые указания

Препарат содержит вспомогательные вещества, которые иногда не полностью растворяются во влагалище. Поэтому остатки вагинальной таблетки можно обнаружить на нижнем белье. На эффективность препарата это не влияет.

В редких случаях, при чрезмерной сухости влагалища, есть вероятность, что таблетка останется нерастворенной. Для предотвращения этого перед тем, как вводить вагинальную таблетку, ее необходимо смочить водой (в течение 1 секунды под струей воды).

В период лечения рекомендуется чаще менять прокладки и нижнее белье. Если клинические признаки инфекции сохраняются после завершения лечения, следует провести повторное микробиологическое исследование для выявления возбудителя и подтверждения диагноза.

В период лечения препаратом рекомендуется воздержаться от половых контактов. Для предотвращения урогенитальной реинфекции необходимо одновременное лечение половых партнеров.

При лечении вагинальных инфекций препарат нельзя применять во время менструации, лечение целесообразно начинать после менструации.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и т.п.)

Форма выпуска

Таблетки вагинальные, 10 мг.

По 6 или 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП - 006803-250221
СОГЛАСОВАНО

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии

АО «Биннофарм», Россия.

124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 1.

Тел.: +7 (495) 646-28-68, +7 (495) 510-32-88.

www.binnopharm.ru

Производитель

АО «ФП «Оболenskое», Российская Федерация.

142279, Московская обл., Серпуховский м.р-н, г.п. Оболенск, рп. Оболенск, район рп

Оболенск промышленная зона, влад. №39, стр.1.


Тел./факс: (4967) 36-01-07.

www.obolensk.ru

Директор по регуляторике и исследованиям



Сетдекова Г.У.



1129358